



Kaip elgtis po danties šalinimo?

- 30 min. laikykite sukąstą tamponėlį.
- 2 val. nevalgykite.
- Pirmas 6-8 val. galite naudoti šaltą kompresą arba ledų maišelį. Uždėkite jį ant veido ir palaikykite 15 min. Vėliau šią procedūrą pakartokite.
- Neskalaukite burnos tą pačią dieną.
- Kitą dieną paskalaukite, nestipriai, ypač po valgio, dezinfekuojančiais tirpalais ("Eludril", "Perio – aid", 0,05 chlorcheksidino tirpalais.).
- Nelieskite žaizdos pirštais ir liežuvio.
- Po danties šalinimo galite jausti diskomfortą. Praėjus 2-3 val. išgerkite skausmą malšinančių vaistų („Ibumetin“, „Dolmen 25mg (milteliai)“, „Ibuprofen 600mg“ ir kt.).
- Nieko baisaus, jeigu seilės susimaišys su krauju keletą dienų po danties šalinimo. Jeigu kraujavimas nesustoja – uždėkite drėgną, švarų tamponėlį ant žaizdos ir sukandę palaikykite 30-45 min.
- Patartina valgyti minkštą maistą pirmas 24 val. Venkite kieto, aštraus ir karšto maisto, kuris gali sukelti sudirginimą ar kraujavimą. Gerkite daug skysčių.
- Jeigu jums buvo paskirti vaistai, naudokite juos, kaip nurodė gydytojas. Taip pat vykdykite kitus gydytojo nurodymus ir patarimus.
- Nepalikite vaikų be priežiūros, nes veikiant vaistams jie gali susikramtyti lūpas. Jei nuskausminimas buvo atliktas apatiniame žandikaulyje guldykite vaikus ant šono, nes liežuvio gali užkristi ant kvėpavimo takų ir atsiranda galimybė uždusti.
- Stenkitės nedirbti sunkaus fizinio darbo, nevartokite alkoholinių gėrimų, pasistenkite nebūti karštoje aplinkoje (pliaže, pirtyje ir pan.).
- Valykite dantis švelniai, minkštu dantų šepetėliu, netraumuodami dantenu ir žaizdos.

KAUNE

Uosio g. 42, Kaunas
LT-50143
+370 652 59597
info@impladenta.lt

VILKAVIŠKYJE

Kęstučio g. 8-11, Vilkaviškis
LT-70102
+370 616 88881
info@impladenta.lt

RASEINIUOSE

T. Daugirdo g. 8, Raseiniai
LT-60151
+370 652 59597
info@impladenta.lt